

БЕЛИРЕСТ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Белирест.

Международное непатентованное название:
Трипсин + Бромелаин + Рутозид.

Лекарственная форма: кишечнорастворимые
таблетки.

Состав: каждая кишечнорастворимая таблетка
содержит:

Трипсин ВР 48 мг;
Бромелаин 90 мг;
Рутозида тригидрат ВР 100 мг;

Цвет: заката.

Фармакотерапевтическая группа: Препарат с
противовоспалительным действием. Иммуномоду-
лирующее средство.

Код АТХ: M09AB52.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Белирест представляет собой комбинацию ферментов
(бромелаин, трипсин, рутин). *Бромелаин и трипсин*
способствуют быстрому расщеплению клеточных
фрагментов и метаболических продуктов воспали-
тельного процесса, рутин восстанавливает проница-
емость стенок сосудов, что приводит к уменьшению
отеков и гематом.

Белирест оказывает противовоспалительное,
фибринолитическое, антиагрегантное, иммуномоду-
лирующее и противоотечное действие, комплексно
воздействуя на физиологические и патофизиоло-
гические процессы.

Улучшает функциональное состояние клеток крови и
сосудистой стенки; снижает вязкость крови и риск
образования тромбов в сосудах, способствует лизису
уже образовавшихся тромбов. Улучшает микроцирку-
ляцию в очагах хронического воспаления, повышает
доставку кислорода и питательных веществ,
стимулируя тем самым репаративные процессы при
хронических заболеваниях и в послеоперационном
периоде. В результате этого уменьшается отек, быстрее
рассасываются гематомы, и уменьшается болевой
синдром.

Белирест улучшает кровоснабжение бронхов и легких
при хронических заболеваниях верхних дыхательных
путей, в т.ч. обусловленных курением; разжижает
мокруту, улучшает функцию мерцательного эпителия и
восстанавливает дренажную функцию бронхов.

Препарат повышает эффективность антибиотико-
терапии.

Фармакокинетика:

После приема препарата Белирест внутрь входящие в
состав препарата ферменты всасываются из тонкой
кишки путем резорбции интактных молекул и,
связываясь с транспортными белками крови, попадают
в кровоток. Затем ферменты, мигрируя по сосудистому
руслу, накапливаются в зоне патологического процесса,
независимо от места локализации в организме.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- лечение послеоперационных осложнений в хирургии,
стоматологии и при пластических операциях
(нагноение, тромбозы, спайки);
- с целью профилактики спаечной болезни,
лимфатических отеков, микроциркуляторных
расстройств; при ожогах;
- повреждения сухожилий, связок, спортивные травмы;
- лечение острого тромбоза глубоких вен, тромбфле-
битов поверхностных вен, постфлебитического
синдрома, хронических артериопатий (в т.ч.
облитерирующий атеросклероз артерий нижних
конечностей);
- лечение острых и хронических воспалений
мочеполового тракта (уретрит, цистит, цистопиелит,
простатит);
- лечение острых и хронических воспалительных
заболеваний органов малого таза (аднексит,
сальпингоофорит), сосудистых осложнений
климактерического периода, для снижения частоты и
выраженности побочных эффектов заместительной
гормональной терапии в гинекологии;
- ИБС, профилактика приступов стенокардии;
- хронический гепатит;

- ревматоидный артрит, анкилозирующий спондило-
артрит, реактивный артрит, ревматическое поражение
мышечных тканей.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость препарата;
 - врожденные или приобретенные нарушения
свертывания крови (в т.ч. гемофилия);
 - детский возраст (опыт применения отсутствует).
- С осторожностью применять при проведении
гемодиализа.

Беременность и лактация:

С осторожностью следует назначать Белирест при
беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы:

Взрослым с целью лечения препарат назначают по 3
таблетки 3 раза в сутки в течение 2 недель.

С целью профилактики рекомендуется применять по 2
таблетки 3 раза в сутки в течение 2 недель.

Изменение дозы препарата или курса лечения врач
определяет индивидуально.

Таблетки следует принимать не менее чем за 30 мин до
еды, не разжевывая, запивая водой (200 мл).

Побочное действие:

Белирест хорошо переносится пациентами. В
отдельных случаях наблюдаются учащение стула,
изменения консистенции и запаха кала, которые быстро
кипируются при временном снижении дозы препарата.
Редко возникают аллергические реакции (кожная сыпь,
зуд), которые исчезают после прекращения лечения
препаратом. При применении препарата отмечались
тошнота, метеоризм, боли в животе, головная боль,
головное головокружение, экзантема, общая слабость. Возможно
появление временного ощущения переполнения
кишечника. Это можно предотвратить, разделив
суточную дозу на большее количество разовых доз.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата Белирест не
сообщалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными
средствами:**

При одновременном приеме с антибиотиками Белирест
повышает эффективность антибиотикотерапии.

Случаев несовместимости препарата Белирест с
другими лекарственными средствами не отмечалось.

Особые указания:

При инфекционно-воспалительных заболеваниях
Белирест не заменяет лечения антибиотиками.

При обострении симптомов заболевания на фоне
приема Белирест рекомендуется временное
уменьшение дозы. В таких случаях пациент должен
обратиться к врачу.

Препарат не является допингом.

**Влияние на способность к вождению автотран-
спорта и управлению механизмами:**

Препарат не оказывает негативного влияния на
способность к вождению автомобиля и выполнению
работ, требующих высокой скорости психомоторных
реакций.

Форма выпуска:

10 кишечнорастворимых таблеток для приема внутрь в
каждом блистере. 2 блистера вместе с инструкцией по
применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при
температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для
детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении
срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
SPEY MEDICAL
Лондон, Великобритания
Производитель:
Сайнокем Фармасьютикалс
Индия