



ZENTAVEKS

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Зентавекс.

Международное непатентованное название: Оксид цинка.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав: каждый грамм мази содержит: Оксид Цинка 150 мг.

Фармакотерапевтическая группа:

Дерматотропные средства. Антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D02AB.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Цинка оксид оказывает подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие. Образует альбуминаты и денатурирует белки. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает явления экссудации, воспаления и раздражения тканей, образует защитный барьер от действия раздражающих факторов.

Фармакокинетика:

При внешнем применении цинковая мазь практически не адсорбируется в системный кровоток и не проявляет резорбтивного действия.

Показания к применению:

- лечение «пеленочной» сыпи;
- средство первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины и солнечные ожоги).

Противопоказания:

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Пеленочная сыпь у детей с грудного возраста:

Лечение — перед применением необходимо вымыть и высушить пораженную область. При появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь наносят на кожу 3 или более раз в сутки (обычно при любой смене пеленок или памперсов).

Профилактика — наносят на кожу, покрываемую пеленкой или памперсами, до начала появления признаков раздражения (особенно перед сном), когда ребенок может долгое время находиться в мокрых пеленках (подгузниках, памперсах).

Порезы, царапины и солнечные ожоги: наносят тонким слоем (при необходимости накладывают марлевую повязку). Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции (зуд, кожные высыпания, жжение, покраснения кожи).

Передозировка:

Ни об одном случае передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных.

Особые указания:

Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом!

Не рекомендуется применять при наличии на коже острого гнойно-воспалительного процесса. Не допускать попадания мази в глаза и на поверхность ран. При попадании в глаза промыть их большим количеством проточной воды. Беременные и женщины в период лактации применяют препарат с осторожностью, учитывая соотношение риск/польза.

Форма выпуска:

Мазь в тубе по 30 грамм, вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C и в местах недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Владелец торговой марки и
регистрационного удостоверения:
SPEY MEDICAL Ltd.,
Лондон, Великобритания



Производитель:
Farmalabor,
Produtos Farmacêuticos, S.A.,
Кондейша-а-Нова, Португалия