



ФЕМИНАЦИН

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Феминацин.

Международное непатентованное название: натамицин.

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные.

Состав: 1 суппозиторий содержит:

действующее вещество: натамицин 100 мг;

вспомогательные вещества: цетиловый спирт, сорбитана триолеат, полисорбат-80, натрия гидрокарбонат, адипиновая кислота, твердый жир.

Фармакотерапевтическая группа: Мочеполовая система. Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний. Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикостероидами). Антибактериальные препараты. Натамицин.

Код АТХ: G01AA02.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает фунгицидное действие. Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. К натамицину чувствительны большинство патогенных дрожжевых грибов (особенно *Candida albicans*). Менее чувствительны к натамицину дерматофиты.

Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается.

Фармакокинетика:

Натамицин при местном применении практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек.

Показания к применению:

Вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные главным образом, грибами *Candida*.

Противопоказания:

У гиперчувствительности к натамицину или к любому из вспомогательных веществ препарата.

У детского возраста.

Беременность и период лактации.

Препарат Феминацин можно назначать в период беременности и лактации.

Способ применения и дозы:

Вагинально.

Взрослым назначают по 1 суппозиторию в течение 3–6 дней.

Суппозитории рекомендуется вводить во влагалище как можно глубже (в положении лежа) 1 раз в сутки (на ночь). В случае необходимости проведения лечения в течение нескольких дней курс терапии следует завершить до начала менструации или начинать лечение после ее окончания.

Дети.

Натамицин в форме суппозитория не применяют детям.

Побочные действия:

Нежелательные реакции классифицированы по органам, системам и по частоте их возникновения (классификация MedDRA): очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Общие нарушения и реакции в месте введения: редко – реакции гиперчувствительности к компонентам препарата, ощущение жжения и раздражения в месте введения.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

При применении вагинальных суппозиториях практически исключается системное воздействие, так как препарат не всасывается через слизистую оболочку.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие с другими препаратами не

описано.

Вещества, обладающие окислительными свойствами, такие как пероксиды, перманганат, йод, гипохлориты и т.д. могут инактивировать натамицин.

Особые указания:

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом перед началом применения препарата Феминацин.

Суппозитории под действием температуры тела быстро растворяются, образуя пенистую массу, что способствует равномерному распределению натамицина по слизистой оболочке влагалища.

В случае хронической или рецидивирующей инфекции местное лечение может быть дополнено назначением таблеток и/или крема натамицина.

В период менструации терапию суппозиториями следует прерывать.

В период лечения нет необходимости в исключении половых контактов, однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения партнера. В период лечения следует использовать барьерные методы контрацепции.

Цетиловый спирт, который входит в состав суппозитория, может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Применение у пациенток с нарушенной функцией печени и почек Феминацин действует местно. Системная абсорбция действующего вещества практически отсутствует, поэтому при нарушении функции печени и почек, у пациента не требуется изменение режима дозирования.

Применение в гериатрической практике.

Применение препарата возможно в пожилом возрасте по стандартной схеме.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.

Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска:

По 3 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки.

По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

SPEY MEDICAL LTD.



Лондон, Великобритания

Производитель:

ООО «ФАРМАПРИМ»

Республика Молдова