

# ЛАКТОСПЕЙ КИДС

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

**Торговое название:** Лактоспей Кидс.

**Международное непатентованное название:** комбинированный препарат.

**Лекарственная форма:** Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

**Состав:** 1 пакетик содержит:

**Активные вещества:**

Сахаромикцеты Буларди 1,25 млрд;

Лактобактерии рамнозуз 3,0 млрд;

Инулин 25 мг.

**Вспомогательные вещества:** кристаллическая глюкоза, сливочный ароматизатор.

**Фармакотерапевтическая группа:** пробиотики и пребиотики.

**Код АТХ:** A07FA.

**Фармакологическое действие:**

**Фармакодинамика:**

Лактоспей Кидс - содержит пробиотические дрожжи *Saccharomyces boulardii* которые способствуют восстановлению нормальной кишечной микрофлоры при дисбактериозах. При прохождении через ЖКТ, *Saccharomyces boulardii* проявляют биологическое защитное действие в отношении нормальной микрофлоры и слизистой кишечника, конкурируя с патогенными микроорганизмами. Таким образом, попав в кишечник человека, активные Сахаромикцеты подавляют рост патогенной флоры, нейтрализуют действие токсинов, улучшают состояние энтероцитов, повышают местный иммунитет. А когда в кишечнике наведен порядок – спокойно покидают его, освободив место для представителей нормальной флоры. В то же время *Saccharomyces boulardii* благоприятно влияют на внутреннюю секрецию кишечника (выработку различных необходимых веществ) и повышают активность пищеварительных ферментов. Устойчивость *Saccharomyces boulardii* к антибиотикам позволяет использовать пробиотик вместе с антибиотиками для профилактики антибиотик-ассоциированной диареи.

**Лактобактерии рамнозуз** - вид грамположительных аэробных неспорообразующих бактерий. Способствуют профилактике и лечению запоров и диареи; амилаза, диастаза, целлюлаза и другие энзимы эффективно способствуют пищеварению. Рекомендовано при дисфункциях желудочно-кишечного тракта, запорах, диарее, раке толстого кишечника, дисбактериозе и т.д. Было отмечено, что такие пробиотики, как Лактобактерии рамнозуз могут быть особенно полезны при лечении диареи, вызванной ротавирусной инфекцией, которая часто поражает младенцев и маленьких детей.

**Инулин** усваивается и гидролизуется полностью кишечной микрофлорой, главным образом бифидобактериями. Образующиеся в процессе микробного метаболизма биологически активные вещества (летучие жирные кислоты, витамины, аминокислоты и др.) используются для выработки энергии и метаболизма кишечника и организма в целом. Способствуя размножению полезной микрофлоры, **инулин** усиливает колонизационную резистентность (т.е. препятствует размножению патогенных микроорганизмов) и детоксикационные функции микрофлоры, а также её способность поддерживать все виды обмена веществ в организме, особенно углеводный и липидный метаболизм, и все функции ЖКТ (моторную, секреторную, всасывательную, экскреторную, эндокринную, иммунную).

**Показания к применению:**

- острая и хроническая бактериальная диарея;
- вирусная этиология острой диареи;
- профилактика и лечение диареи;
- профилактика и лечение колитов и диареи, связанных с приемом антибиотиков дисбиоз кишечника;
- синдром раздраженной кишки, профилактика диареи при длительном энтеральном питании через зонд.

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- пациенты с установленным центральным венозным катетером.

**Беременность и период лактации:**

В качестве меры предосторожности перед использованием этого препарата в период беременности желательна консультация с врачом.

В период кормления грудью можно применять препарат под медицинским наблюдением.

**Способ применения:**

Принимать внутрь.

Содержимое пакетика смешать с водой. Лактоспей Кидс содержит живую культуру. Следовательно, препарат не следует смешивать с очень горячими (свыше 50 °С) или холодными напитками, молоком, очень горячей или холодной пищей.

**Дети от 1-2-х лет** – по 1/2 пакетика 2 раза в день.

**Дети от 2-3-х лет** - по 1/2 пакетика 2-3 раза в день.

**Дети от 3-5 лет** – 1/2 пакетика 3 раза в день.

**Дети от 5-7 лет** - по 1 пакетик 2 раза в день.

**Взрослым и детям старше 7 лет** – по 1 пакетик 2-3 раза в день.

Препарат следует применять каждое утро натощак или за 1 час до еды.

Рекомендуемый курс приема: 5-7 дней.

Максимальный период применения – 15 дней.

**Побочные действия:**

Лактоспей Кидс безопасен для большинства младенцев и детей. Возможны побочные эффекты, такие как кишечные газы или вздутие живота. Риск фунгемии у госпитализированных пациентов с центральным венозным катетером.

**Передозировка:**

Случаев передозировки препарата Лактоспей Кидс не наблюдалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препараты для снижения иммунной системы (иммунодепрессанты) взаимодействуют с лактобактериями. Использование антигрибковых препаратов может уменьшить эффективность препарата Лактоспей Кидс. Совместное применение ингибиторов моноаминоксидазы может повысить артериальное давление. Допускается одновременный прием с антибиотиками.

**Особые указания:**

Желательно не открывать пакетики вблизи пациентов с установленными центральными венозными катетерами, чтобы избежать колонизации, особенно связанной с механическим переносом при манипуляциях с катетером. У пациентов с центральным венозным катетером, даже не получавших препарат с Сахаромикцеты Буларди, в очень редких случаях фунгемии (проникновения в кровь дрожжевых грибов), чаще всего является лихорадка и положительная на сахаромикцеты культура крови. Если симптомы заболевания сохраняются в течение более 2 дней лечения при обычной дозировке, необходима консультация врача и коррекция дозировки.

**Форма выпуска:**

10 пакетиков вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре от 4° С до 25° С. Защищать от прямых солнечных лучей и влаги.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.



Произведено для:  
SPEY MEDICAL Ltd.,  
Лондон, Великобритания.

Производитель:  
SENSILAB SA,  
Лодзь, Польша