



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Витаспей бэби.

Международное непатентованное название: поливитамины.

Лекарственная форма: капли для приёма внутрь.

Состав: 1 мл раствора содержит:

Действующие вещества:

Витамин А 300 мкг (1000 МЕ)

Витамин D3 10 мкг (400 МЕ)

Витамин С 35 мг

Вспомогательные вещества: стерильная вода, сорбат калия.

Фармакотерапевтическая группа: мультивитамины.

Код АТХ: А11J.

Фармакологическое действие:

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, необходимых детям первого года жизни. Действие определяется свойствами витаминов, входящих в состав препарата.

Витамин А (ретинол):

Играет важную роль в образовании белка, называемого коллагеном, который составляет значительную часть материала соединительных тканей, костей, хрящей, зубов и кожи. Имеет важное значение для функционирования иммунокомпетентных клеток крови, способствует повышению сопротивляемости организма к различным инфекциям. Аскорбиновая кислота способствует всасыванию неорганического железа из пищеварительного тракта, кроме того обладает антиоксидантными свойствами.

Витамин D3 (колекальциферол):

Необходим для нормального формирования костей и зубов в растущем организме. Поддерживает уровень неорганического фосфора и кальция в плазме, и повышает всасывание кальция в тонкой кишке, предупреждая развитие рахита и остеопороза.

Витамин С (аскорбиновая кислота):

Играет важную роль в образовании белка, называемого коллагеном, который составляет значительную часть материала соединительных тканей, костей, хрящей, зубов и кожи. Имеет важное значение для функционирования иммунокомпетентных клеток крови, способствует повышению сопротивляемости организма к различным инфекциям. Аскорбиновая кислота способствует всасыванию неорганического железа из пищеварительного тракта, кроме того обладает антиоксидантными свойствами.

Показания к применению:

Детям с первых дней жизни:

- профилактика недостаточности витаминов А, D3 и С;
 - профилактика рахита у детей;
 - в качестве средства для повышения сопротивляемости организма к инфекциям.
- Способствует правильному формированию и развитию опорно-двигательного аппарата и органов, обеспечивающих рост ребенка.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, гиперкальциемия (в связи с наличием в составе колекальциферола).

С осторожностью при почечной недостаточности и заболеваниях сердца.

Беременность и период лактации:

В период беременности и грудного вскармливания обычно не применяется.

Способ применения и дозы:

Внутрь. *Детям с первых дней жизни* - по 1 мл (25 капель) в сутки сезонными курсами по 2-3 месяца. В летнее время года дозу можно уменьшить до 0,5 мл (13 капель) в сутки.

Продолжительность приема и курс могут быть изменены по рекомендации врача.

Принимать одновременно с приемом пищи или сразу после него.

Перед применением взбалтывать.

Побочные действия:

Возможны расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта в том числе желудочно-кишечный дискомфорт, диарея, тошнота, запор.

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата возможны аллергические реакции в виде зуда или крапивницы.

Передозировка:

Симптомы передозировки - потеря аппетита, сухость слизистой оболочки полости рта, полиурия, диарея.

При возникновении симптомов передозировки необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении противосудорожные средства, рифампицин, неомицин снижают абсорбцию ретинола и колекальциферола.

Одновременный прием витамина D с витамином А снижает риск развития передозировки последнего.

Аскорбиновая кислота улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа.

Особые указания:

Во время приема препарата не рекомендуется приём других поливитаминных препаратов во избежание передозировки. Не следует превышать рекомендованную суточную дозу.

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь 30 мл в стеклянном флаконе с крышкой-пипеткой. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия следует хранить в холодильнике. Не замораживать.

Срок годности:

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.