



КУПРЕЙ

Инструкция по применению

Торговое название: Купрей.

Международное непатентованное название: бисглицинат меди.

Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Состав: каждая таблетка содержит:

Медь (бисглицинат меди) 2,5 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, тальк, стеарат магния, диоксид кремния, пленочное покрытие (гипромеллоза, макрогол, рисовый крахмал, эфиры сахарозы и жирных кислот, гидроксипропилцеллюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, индигокармин, карминовая кислота).

Фармакологическое действие:

Медь относится к эссенциальным микроэлементам, поскольку является кофактором значительного числа ферментов, участвуя в липидном, белковом и углеводном обменах.

Принимает участие в формировании эритроцитов и гемоглобина – основных компонентов крови, участвует в транспорте железа, способствует поддержанию в норме уровня гемоглобина.

Медь способствует поддержанию работы нервной системы, участвуя в синтезе нейротрансмиттеров и миелина, которые обеспечивают надлежащую передачу нервных импульсов.

Проявляет антиоксидантные свойства, поскольку является структурным компонентом супероксиддисмутазы, нейтрализующей свободные радикалы. За счет активации работы меланоцитов медь способствует сохранению цвета волос и предупреждает появление седины.

Медь участвует в синтезе коллагена и эластина, улучшая состояние кожи и продлевая ее молодость.

Таблетки Купрей содержат медь в хелатной форме, что обеспечивает высокую абсорбцию без раздражения слизистой оболочки желудка и кишечника.

Показания к применению:

- восполнение дефицита меди;
- иммунодефицитные состояния;
- для улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы;
- для укрепления состояния костной и соединительной ткани;
- при анемии;
- при нарушении липидного обмена (атеросклероз, ожирение, сахарный диабет);
- при бесплодии, приеме противозачаточных средств, снижении полового влечения у женщин;
- при нарушении пигментации кожных покровов;
- для сохранения пигментации волос.

В качестве вспомогательного средства в следующих случаях:

- для оказания антиоксидантного действия при инфекциях;
- при нарушении функции предстательной железы и предупреждения развития злокачественного перерождения простаты;
- для активизации репаративных процессов (заживление ран, трофических язв и т.п.);
- при кожных заболеваниях, в частности псориазе, облысении;
- при расстройстве нервной системы, нарушениях памяти, при

старческой деменции, болезни Альцгеймера;

- при сексуальных расстройствах у мужчин, в том числе некоторых видах импотенции.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- детский и подростковый возраст до 18 лет.

Беременность и период лактации:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Взрослым – по 1 таблетке в день во время еды.

Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости прием можно повторить.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Передозировка: расстройством пищеварения, головокружение или металлический привкус во рту.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется сочетать с полиминеральными препаратами, содержащими медь.

Особые указания:

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска:

120 таблеток в пластиковом белом флаконе. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

SPEY MEDICAL LTD.

Лондон, Великобритания

Производитель:

Fortex Nutraceuticals Ltd.,

Болгария

