

ПРОКТАЛУРОН

Инструкция по применению препарата

Торговое название: Прокталурон.

Международное непатентованное название: Гиалуроновая кислота.

Форма препарата: суппозитории ректальные.

Состав:

Каждый суппозиторий содержит:

Гиалуроновую кислоту 5 мг;

Масло экстракта Центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт Алоэ, масляной экстракт Календулы, эфирное масло чайного дерева, бутилгидрокситолуол (ВГТ), Масса суппоцир А (полусинтетические глицириды), пропилпарабен, изобутил парабены, бутилпарабен.

Фармакотерапевтическая группа: изделие медицинского назначения, (СЕ 0653), улучшающий трофику и регенерацию тканей.

Код АТХ: D03AX.

Фармакологическое действие:

Способствует быстрому восстановлению слизистой оболочки аноректального канала.

Гиалуроновая кислота представляет собой мукополисахаридный натуральный полимер, который является важным интерстициальным компонентом соединительной ткани. Её физико-химические свойства способствуют взаимодействию с другими молекулами и клетками, что делает присутствие гиалуроновой кислоты исключительно важным в ряде биологических процессов. Гиалуроновая кислота образует с молекулами воды дисперсионный матрикс, который играет важную роль в поддержании тонуса кожи и её эластичности. С другими молекулами протеогликанов, гиалуроновая кислота стабилизирует межклеточную массу соединительной ткани.

Физико-химические свойства гиалуроновой кислоты в области раны создают физиологические условия, способствующие её заживлению.

Показания к применению:

- для поддерживающей терапии в процессе восстановления слизистой оболочки аноректального канала после хирургического вмешательства;
- внутренний и внешний геморрой;
- анальные воспаления (в том числе воспаление анальных крипт, проктит и т.д.);
- анальные трещины;
- анальный свищ.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По указанию врача.

Вводить в анальное отверстие 1 суппозиторию 1 раз в сутки, желательно перед сном на ночь, по возможности после опорожнения. Не глотать.

Если суппозиторий слишком мягкий, охладите его в холодильнике в течение нескольких минут или подержите его под холодной водой, прежде чем вынуть его из пластиковой упаковки.

Побочные действия:

Относительно препарата никаких серьезных побочных эффектов не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами:

До настоящего времени не известно.

Особые указания:

Длительное употребление препарата, предназначенного для местного применения, может вызвать симптомы гиперчувствительности. В этом случае терапия должна быть прервана, и вы должны проконсультироваться с врачом.

Избегать контакта с глазами!

При беременности проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и рабочими механизмами.

Форма выпуска:

Суппозиторий для ректального применения. 5 суппозиторий в пластиковом корпусе, 2 пластиковых корпуса вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия и сроки хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C и в местах недоступных для детей.

Срок хранения:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для / Manufactured for:
SPEY MEDICAL LTD
Lynton House
7-12 Tavistock Square, London,
WC1H 9LT, England, UK
www.spey.eu

Производитель / Manufactured by:
HELP S.A.: 10 Valaoritou Str.
144 52 Metamorphosis, Attica, Greece
Tel.: 0030 210 28 15 353
Factory: Pedini, 45500 Ioannina, Greece
Tel.: 0030 2651 092 143
www.help.com.gr