

СТОПКОЛИК

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Стопколик.

Международное непатентованное название: Симетикон + Укропное масло + Фенхелевое масло.

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав: каждый мл содержит:

Симетиконовая эмульсия USP экв. симетикону 40 мг;

Укропное масло BP 0,005 мл;

Фенхелевое масло USP 0,0007 мл;

Ароматизированная сиропная основа q.s.

Фармакотерапевтическая группа: Ветрогонное средство.

Код АТХ: A03AX13.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Стопколик - препарат, уменьшающий количество газов в кишечнике. Действующее вещество - симетикон обладает поверхностно-активными свойствами и способностью снижать поверхностное натяжение на границе раздела сред жидкость-газ. При этом происходит слияние пузырьков газа и разрушение пены, вследствие чего высвободившийся газ получает возможность всасываться или выводиться естественным путём под влиянием перистальтики кишечника. Не абсорбируется из ЖКТ. Не метаболизируется и выводится в неизменном виде через кишечник.

Масло укропное - действует как спазмолитическое средство. Помогает при нарушении процесса переваривания пищи, процессах брожения в кишечнике, болях в животе. Укропное масло также способствует отхождению газов, снимает болезненные спазмы.

Масло фенхелевое - оказывает противорвотное, желчегонное, ветрогонное, слабительное, спазмолитическое, диуретическое, противомикробное и седативное действие. Повышает тонус кишечника и возбуждает аппетит.

Фармакокинетика:

Не абсорбируется из ЖКТ. Не метаболизируется и выводится в неизменном виде через кишечник.

Показания к применению:

- x избыточное образование и скопление газов в ЖКТ: симптомы метеоризма (чувство распирания и переполнения в подложечной области, вздутие кишечника), аэрофагия, диспепсия;
- x кишечные колики у новорожденных и грудных детей;
- x повышенное газообразование после операций;
- x подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (УЗИ, рентгенография и др.), в т.ч. в качестве добавки к суспензиям контрастных средств для получения изображения методом двойного контрастирования;
- x отравления тензидами (в т.ч. поверхностно-активными веществами, входящими в состав моющих средств) в качестве пеногасителя.

Противопоказания:

- x повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- x кишечная непроходимость.

Способ применения и дозы:

Перед употреблением флакон необходимо взбалтывать. Препарат принимают внутрь во время приема пищи или после еды, при необходимости также перед сном.

Младенцы до 6-и месяцев: по 5-10 капель 4 раза в день;

Дети от 6-12 месяцев: по 10-20 капель 4 раза в день;

Дети старше 1 года: по 20-25 капель 4 раза в день;

или по назначению врача.

Перед употреблением хорошо взбалтывать.

Побочное действие:

В отдельных случаях – индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки препаратом не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных.

Особые указания:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Не установлено.

Форма выпуска:

Капли 15 мл в стеклянном флаконе с капельницей вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
SPEY MEDICAL
Лондон, Великобритания
Производитель:
Некст Вейв (Индия)
Индия