



ЦИМИКЛИН

Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства

Торговое название: Цимиблин.

Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Состав: 1 таблетка содержит:

Активное вещество:

Цимицифуги экстракт сухой 20 мг.

Вспомогательные вещества: сорбитол, стеарат магния, краситель желтый закат

Фармакотерапевтическая группа: противоклимактерическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: G02CX04.

Фармакологические свойства:

Цимиблин обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает положительное терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему. Применение препарата Цимиблин способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов вегетососудистых нарушений и психоэмоциональных расстройств в климактерический период. Терапевтический эффект препарата Цимиблин развивается постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели лечения.

Показания к применению:

Вегето-сосудистые и психоэмоциональные расстройства в пре-, мено- и постменопаузе («приливы», повышенная потливость, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, изменение настроения, апатия и др.).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эстроген - зависимые опухоли.

С осторожностью: нарушение функции печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Беременность и период лактации:

Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы:

Цимиблин принимают внутрь по 1 таблетке (не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости) 2 раза в сутки, по возможности, в одно и то же время суток (утром и вечером). Длительность лечения определяется врачом.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. В редких случаях возможно появление боли в эпигастриальной области и увеличение массы тела.

Передозировка:

При случайном применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, могут наблюдаться диспепсия, гастралгия, нарушение функции печени.

Лечение симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами:

В связи с возможностью передозировки не рекомендуется принимать с другими препаратами, содержащими цимицифуги экстракт.

Особые указания:

Без консультации врача препарат не следует принимать более 3 месяцев

При изменении характера менструального цикла, а также при продолжительных или других вновь возникающих жалобах необходимо обратиться к врачу.

При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Препарат в рекомендуемых дозах не оказывает влияния на способность водить автомобиль и работать с машинами.

Форма выпуска:

20 таблеток в каждом блистере. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Владелец торговой марки

ирегистрационного удостоверения:

SPEY MEDICAL Ltd.



Лондон, Великобритания

Производитель:

Коç İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağlık Şirketi

Анкара, Турция